

Lizipaina[®] comprimidos para chupar

Lisozima hidrocloreto/Papaína/Bacitracina

Composición:

Un comprimido contiene:

Lisozima hidrocloreto (obtenida del huevo) 5 mg

Papaína 2 mg

Bacitracina 3 mg

Excipientes: Sacarina, sorbitol, aroma de menta, estearato de magnesio, c.s.

Forma farmacéutica y contenido del envase

Envase con 1 tubo de 20 comprimidos para chupar.

Actividad

Antiinfeccioso bucofaríngeo.

Titular y fabricante

Titular:

Sanofi - aventis, S.A.

C/ Josep Pla, 2

08019 – Barcelona

Fabricante:

Delpharm Reims, S.A.S.

10, Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims (Francia)

Indicaciones

Alivio sintomático de las afecciones leves de la garganta y de la boca:

- irritaciones de la garganta,
- pequeñas heridas leves de las encías como las producidas por dentaduras postizas,
- ronqueras y afonías.

Contraindicaciones

Niños menores de 3 años (presencia de aroma de menta).

Sensibilidad o alergia a alguno de sus componentes.

Si es alérgico al huevo no tome este medicamento debido a que la lisozima se obtiene de este alimento.

Precauciones

No administrar a niños menores de 6 años, sin consultar al médico.

Si los síntomas persisten más de 2 días, o se agravan, o van acompañados de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consultar al médico lo antes posible.

Interacciones

Evitar la utilización simultánea con otros antisépticos bucofaríngeos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento.

Advertencias

Advertencia sobre excipientes:

Este medicamento contiene 1,4 g de sorbitol como excipiente por comprimido. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Embarazo y lactancia:

Importante para la mujer:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Uso en niños:

Ver precauciones y contraindicaciones.

Uso en ancianos:

No se dispone de información específica.
Consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción:

No se han descrito

Posología

Adultos:

1 comprimido disuelto en la boca, cada dos horas, hasta un máximo de 6 a 8 comprimidos al día.

Niños de 6 a 15 años:

Dosis máxima de 3 a 4 comprimidos al día.

Instrucciones para la correcta administración del preparado:

No masticarlos ni tragarlos enteros.
Dejar deshacer lentamente el comprimido en la boca.

Sobredosis

En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes dosis pueden producirse molestias digestivas.

Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida, o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Reacciones adversas

Trastornos del sistema inmunológico:

Frecuencia desconocida: reacciones alérgicas, incluyendo edema de laringe, angiodema y urticaria.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <http://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Conservación

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Caducidad

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesite en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Texto revisado: Diciembre 1999.

abcd

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.